

**Nom latin :** Motacilla cinerea

**Famille :** Motacillidés

**Nom breton :** kannerez-dour



### Description

**Taille :** de 18 à 20 cm de long

**Envergure :** 29 cm

**Poids :** de 14 à 25 g

Le sommet de la tête et le dos sont gris. Sa poitrine arbore un jaune vif tout comme ses sous-caudales. Son œil est encadré par une moustache et un sourcil blancs. Les rémiges et la queue sont noires. Le ventre lui est blanc. Au printemps le mâle se présente avec une bavette noire encadrée de blanc. On peut la confondre avec la bergeronnette printanière, la différence imparable est la couleur de ses pattes celle-ci est la seule à avoir d'élégantes pattes rosées.



### Habitat

La bergeronnette des ruisseaux est très dépendante de l'eau, surtout une eau courante, souvent à proximité des habitations et des ponts. Elle niche le long des torrents et des rivières de collines, tant en milieu boisé qu'en milieu ouvert.



La bergeronnette des ruisseaux



### Mœurs

**Migration** : Les populations bretonnes sont sédentaires, seules les nordiques migrent vers la Méditerranée et l'Afrique du Nord.

**Chasse** : Elle cueille ses proies sur les feuilles ou les happent en plein vol.

**Nidification** : En février mars, ce passereau réunit brindilles, mousses, feuilles mortes pour édifier son nid en forme de demi-sphère. Pour l'emplacement de ce dernier, il choisit des cavités dans les rochers ou sous des racines.

**Reproduction** : fin mars, la femelle pond 4 à 6 œufs que les parents couvent durant douze à quatorze jours. Ils se partagent également le soin de nourrir les petits au nid, pendant 12 à 13 jours encore. La plupart des couples élèvent une seconde nichée de juin à juillet.

### Régime alimentaire

les insectes et leurs larves sont ses mets favoris. Ainsi, elle ingurgite nombre de coléoptères, de libellules et d'éphémères. Capturant ses proies au sol et au bord de l'eau elle s'attaque aussi aux crustacés et aux mollusques divers.

### Statut et répartition

Elle est présente en France et en Bretagne où elle est sédentaire.

### Le saviez-vous ?

la bergeronnette est classée dans la famille des motacillidés. L'origine de ce mot vient du latin « moto » qui signifie bouger et « cilla » qui désigne la queue. En effet les bergeronnettes ont pour particularité d'imprimer à leur corps un mouvement de balancier lorsqu'elles sont à terre.

