

**Nom latin:** Numenius arquata

**Ordre :** Charadriiformes

**Famille :** Scolopacidés

**En Breton :** Paotr- saout al lannioù

### Description :

**Taille :** de 50 à 60 cm de long

**Envergure :** de 80 à 100 cm

**Poids :** Femelle : 675 à 950 g ; Mâle : 575 à 800 g

On peut le décrire comme le plus grand limicole. On le reconnaît grâce à son bec incurvé vers le bas. Son plumage est beige taché de brun sur le dessus. Le dessous est blanc rayé de brun, le bas-ventre d'un blanc immaculé. La mandibule inférieure de son bec se colore de rose en hiver. Ses longues pattes sont gris-bleu, terminées par 4 doigts, c'est un marcheur. La femelle du courlis cendré est plus grande et a un bec plus long que celui du mâle.



Le courlis dans son habitat d'été, la prairie



Le courlis en vol

Photos: Pascal Dubois

### Habitat:

En hiver, il fréquente souvent les estuaires et vasières littorales et en été, les landes, les prairies humides et les tourbières.

## Mœurs :

**Vol** : il est assez facilement identifiable en vol grâce à son croupion blanc, ses ailes cassées et son long bec.

**Nidification** : Le courlis niche à l'intérieur des terres dans les landes, les tourbières et les prés humides. C'est le mâle qui prépare le nid en creusant dans une touffe d'herbes hautes ou une autre plante.

D'avril à mai, la femelle pond 4 œufs qu'elle couve avec le mâle durant 26 à 30 jours. C'est plutôt le mâle qui les élève. Les petits quittent très rapidement le nid. On dit qu'ils sont nidifuges.

**Migration**: Lors des migrations de l'automne et du printemps il fréquente assidûment les estuaires et autres milieux littoraux.

**Régime alimentaire** : Il utilise son long bec pour sonder la vase et fouiller entre les herbes à la recherche de vers, mollusques,... Il se nourrit parfois de baies, de graines et de céréales à l'occasion. Dans les prairies où il niche, le courlis consomme beaucoup d'insectes et de lombrics.


## Statut :

En France, les populations hivernantes sont en déclin et la population nicheuse est à surveiller.

## Répartition:

- Zone de présence en hiver
- Zone de présence en période de reproduction
- Zone de présence toute l'année et nidification

Source:  
Guide encyclopédique des oiseaux-Nathan



## Le saviez vous ?

Son nom lui vient de son cri, c'est ce que l'on appelle une onomatopée (comme pour le coucou).