

Le Cygne tuberculé

Ordre : Anseriformes

Famille : Anatidés

Nom latin : Cygnus olor

Nom breton : Alarc'h

Description

Taille : de 125 à 160 cm de long

Envergure : de 200 à 250 cm

Poids : de 9 à 13kg

Le cygne est un oiseau majestueux. On le classe parmi les plus gros représentants de l'avifaune européenne. Son plumage est de couleur blanc neige. A la base de son bec de couleur orange rouge, on distingue un tubercule noir très caractéristique. Les deux sexes sont identiques sauf au printemps où le tubercule du mâle est alors plus gros que celui de la femelle.

Vol : Le cygne tuberculé est un oiseau très lourd. Pour prendre son envol, il agite ses grandes ailes, « marche » sur l'eau avant de s'élever. Il vole avec le cou tendu vers l'avant. Il a une vitesse en vol de 85 à 88 km/heure.



Le cygne tuberculé et son plumage blanc immaculé.

Habitat et moeurs

Habitat :

Il affectionne toutes les étendues d'eau à courant nul ou très faible comme les étangs, les marais mais aussi les zones côtières et les baies abritées. Son espace vital est assez vaste (1.5 à 4 hectares).

Mœurs :

Comportement : C'est un oiseau pas timide mais qui peut devenir agressif, surtout au moment de la nidification.

Le Cygne tuberculé

Il a une démarche assez lourdaude et se dandine.

Quand il nage, le cygne tuberculé positionne son cou en une courbe gracieuse, avec le bec pointé vers le bas, contrairement aux autres cygnes et oies, qui gardent le cou bien droit et le bec levé. Dès qu'un intrus, animal ou humain, s'approche trop près du nid, il adopte une attitude caractéristique, arrivant rapidement sur l'eau, cou et tête rejetés vers l'arrière comme un arc prêt à se détendre. En cas de combat, les cygnes cherchent à « mordre » leur adversaire pour leur maintenir la tête sous l'eau. L'issue de cet affrontement est parfois mortel.

Nidification :

Le nid, bâti sur une rive caillouteuse, est d'aspect grossier. Il est constitué d'algues, de branchages et débris divers. Les individus sauvages construisent leurs nids dans les roseaux. Entre avril et mai, la femelle pond 5 à 12 œufs, blanc verdâtre clair. Après une incubation d'environ 36 jours, les petits naissent et vont directement à l'eau (nidifuges). Ceux-ci ne sauront voler qu'au bout de 4 ou 5 mois. Ils resteront avec leurs parents jusqu'au printemps suivant. Les petits peuvent se déplacer en montant sur le dos de leurs parents, le plus souvent sur celui de la femelle. Ils restent avec les parents jusqu'à la période de reproduction suivante.

● Régime alimentaire

Il se nourrit de végétaux aquatiques qu'il prélève au fond de l'eau à l'aide de son long cou. Sur les rives, il consomme des plantes et leurs racines. Il n'hésite pas à fouiller la vase pour s'enquérir de mollusques. Il pêche également des petits poissons.




*Deux cygnes en quête
de nourriture.*

Le Cygne tuberculé

Statut et répartition

Le cygne est sédentaire en France. C'est le plus commun des cygnes en Europe. Il est protégé par la convention de RAMSAR (protection des zones humides comme habitat des oiseaux d'eau).

-  Zone de présence en hiver
-  Zone de présence en période de reproduction
-  Zone de présence toute l'année et nidification



Le saviez-vous ?

Le Cygne tuberculé dresse, dresse, siffle, trompette. Son cri le plus fréquent est un 'vhor' soufflé. Il émet parfois un 'gaoh' assez sonore, un peu comme les goélands. Son cri d'agressivité ressemble à un sifflement de serpent.

Contrairement à la croyance populaire, un couple de cygnes n'est pas uni pour la vie. Le mâle peut avoir jusqu'à quatre partenaires, ou même « divorcer » pour une autre. Il est en général uni au moins pour une saison.

© P. Dubois - 12 janvier 2003
Cygnus olor
Vaulx-en-Velin (69) - Parc de Miribel / Jonage

