

Nom latin: Asio flammeus

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigidés

En Breton : Toud gwern

Description

Taille : de 34 à 42 cm

Envergure : de 95 à 110 cm

Poids : de 260 à 420 g

Les parties supérieures de son corps sont brun noir, tachées de crème, quant aux parties inférieures, elles sont brun jaunâtre clair, densément rayées de brun noir au cou et à la poitrine. Son plumage est blanc, taché de brun foncé. Ses yeux sont noirs avec les iris jaunes. Les aigrettes sont très courtes et le plus souvent cachées (visibles lorsqu'il est inquiet).

Vol : La silhouette en vol est caractérisée par de longues ailes étroites et une grosse tête de chouette. Durant son vol, ses ailes battent avec un mouvement saccadé. Il plane en effectuant des cercles.



photo: Pascal Dubois

Habitat

Il aime les espaces découverts et sauvages, comme les prairies herbeuses, les terrains cultivés, les marais salants, les estuaires, les prairies montagneuses et la toundra alpine et arctique. Son aire de reproduction doit avoir une surface suffisante pour concilier nids et sources de nourriture. Il niche dans les zones humides : prairies, marais, zones alluviales, tourbières.

Régime alimentaire

Le hibou des marais est friand de petits mammifères, mais il attrape aussi des oiseaux. Les campagnols sont leur mets de choix, mais les souris, les musaraignes, les écureuils, les taupes, les rats, les chauves-souris, les lapins et les rats musqués sont tout aussi appréciés. Il chasse aux environs de l'aube, assez bas, au vol, en battant des ailes sur place. Quand il chasse dans les zones humides ou le long des côtes, il attrape davantage d'oiseaux comme des limicoles, des sternes, de jeunes goélands et autres oiseaux marins. A l'intérieur des terres il se nourrit aussi d'alouettes, de merles et de pipits.

Mœurs

Migration : C'est un migrateur partiel, c'est-à-dire qu'une partie seulement de sa population migre vers le sud en hiver et remonte au printemps.




Nidification : C'est le seul rapace nocturne d'Europe à construire un nid, la femelle utilise une dépression existante ou gratte le sol pour en créer une. Ensuite elle garnit cette cuvette d'herbes, de rameaux fins et de plumes qu'elle s'arrache de la poitrine, sur environ 2cm.


Reproduction : Au printemps, la femelle pond entre 4 et 8 œufs. Ils incubent ensuite durant 21 à 37 jour. La femelle assure la quasi-totalité de l'incubation, nourrie par le mâle qui pourra prendre son tour occasionnellement. Les jeunes quittent le nid au bout de deux semaines environ et volent quand ils ont de 24 à 27 jours.

Statut et répartition

Les populations de hiboux fluctuent énormément selon la disponibilité en petits mammifères. Il lui arrive tout de même de nicher en Bretagne où il peut se montrer fidèle à certains sites de nidification.

Cette espèce est protégée sur le territoire français.

-  Zone de présence en hiver
-  Zone de présence en période de reproduction
-  Zone de présence toute l'année et nidification



carte de répartition à partir du guide encyclopédique des oiseaux

Le saviez vous ?

Les hiboux se distinguent des chouettes par leurs « oreilles » qui sont en fait deux plumes sur la tête appelées aigrettes. Celles du hibou des marais sont peu visibles voilà pourquoi on le surnomme aussi hibou brachyote, du grec brachus qui signifie court.

Pour aller plus loin

Guide encyclopédique des oiseaux du paléarctique occidental-Nathan
Guide des oiseaux d'Europe- Petterson- Editions Delachaux et Niestlé