

**Nom latin :** Nemacheilus barbatulus

**La Famille :** Cobitidés

## Description

Le corps est cylindrique, le dos et les flancs sont gris-brun avec des marbrures sombres ; le ventre est blanc; les nageoires dorsale et caudale ont des rangées de points noirs.  
La tête est aplatie dorso-ventralement, la bouche est infère avec 6 barbillons sur la lèvre supérieure, la narine antérieure est tubulaire.  
Taille : de 8 à 18 cm.



© R. Swainston/ANIMA, www.anima.net.au

## Moeurs

La loche franche est une espèce d'accompagnement de la truite. Poisson sédentaire, et à activité essentiellement nocturne, elle vit près des rives dans les cours d'eau et les lacs clairs à fond graveleux. La reproduction a lieu en avril-mai parmi les pierres et la végétation des eaux courantes. Les deux sexes arborent alors un tubercule nuptial sur la face interne des nageoires pelviennes. Les oeufs (500 000 à 800 000 par femelle) adhèrent aux pierres.

## Habitat

Elle est commune dans toutes les rivières à truites de France. Elle fréquente prioritairement les zones sableuses et vaseuses mais sait très bien se faufiler entre les cailloux des zones courantes pour traquer ses proies.



## Régime alimentaire

- La loche franche possède des barbillons qui lui permettent de trouver sa nourriture sans la voir. Elle est en fait essentiellement nocturne, mais surtout elle se nourrit d'invertébrés vivant sous les rochers (il y fait noir) et dans le sable (impossibles à observer). Les barbillons lui sont donc essentiels dans ce milieu limpide où les proies sont invisibles. Elle se nourrit essentiellement d'invertébrés aquatiques tels que les larves d'éphémères, de trichoptères...etc

Les petits barbillons de la loche



## Le saviez-vous ?

- La loche est le poisson typique des pêches de l'enfance et des culottes courtes. Elle était capturée à l'aide d'une bouteille à viron et servait de leurre pour la pêche du saumon.

